

**MEDICAMENTOS QUE PUEDEN CAUSAR AUMENTO DE SANGRADO  
DURANTE O DESPUÉS DE UNA CIRUGÍA**

Durante las dos semanas previas a la cirugía no debe ingerirse ninguna medicina que contenga aspirina. La aspirina puede interferir con la coagulación normal de la sangre. La siguiente es una lista parcial de medicamentos que contienen aspirina y las cuales deben evitarse. Si tienen preguntas, favor contactarme. En la mayoría de los casos el Tylenol y otras medicinas que contienen acetaminofen pueden usarse en lugar de la aspirina o de medicamentos que contengan aspirina.

Alka-Seltzer	Equagesic
Anacin	Excedrin
APC Tablets	Extra Strength Bufferin
APC with Butalbital	Four Way Cold Tablets
APC with Codeine	Fiorinal
Apectol	Fiorinal with Codeine
Arthritis Pain Formula by Anacin	Gemnisyn
Arthritis Strength Bufferin	Goody's Headache Powder
Ascriptin	Midol
Ascriptin with Codiene	Measurin
Aspirin	Norgesic
Aspirin Suppositories	Norgesic Forte
Bayer Aspirin	Norwich Aspirin
Bayer Children's Cold Tablets	Pabirin Buffered Tablets
Bayer Time Released Aspirin	Panalgesic
BC	Percodan
Bufferin	Phenergan Compound
Bufferin Compound	Quiet World Analgesic/ Sleeping Aid
Butalbital with APC	St. Joseph's Aspirin for Children
Cama Inlay Tabs	St. Joseph's Cold Tablets
Cetased	Sine-Off
Cheracol	Sine-Aid
Congespirin	SK-65 Compound
Cope	Stanback
Calurin	Supac
Coricidin (multiple types)	Synalgos
Darvon Compound	Synalgos-DC
Darvon with ASA	Stendin
Darvon N with ASA	Talwin Compound
Dristan	Vanquish
Ecotrin	Verin
Empirin	Viro-Med Tablets
Empirin with Codiene	Zorpin
Emprazil	

Otros medicamentos que deben evitarse 3 o 4 días antes de la cirugía son anti-coagulantes tales como Warfarin, Coumadin, y Heparin. La Persantine (dipyridamole) afecta la coagulación de la sangre y debe evitarse por completo por dos semana, así como la Vitamina E. Agentes anti-inflamatorios de esteroides como Ibuprofen, Advil, Motrin, Naprosyn, Tolectin, Anaprox, etc., no deben tomarse durante las dos semanas previas a la cirugía.